


# やればできる！ リグロスを用いた歯周組織再生療法 ～理論、手技、医院マネジメントまで～

費やす時間と労力が大きいとされる歯周外科が医院経営にどのように活かされるのか？  
今回は、2部構成でのセミナーとなります。

**Day 1**は、「患者さんのため」だけではなく医院にとってもメリットのあるものにするための「**マネジメント方法**」をお伝えし、結果を出すために必須となる「**知識と手術手技**」についても症例を交えてご紹介致します。来月開催の**Day 2**では、リアル開催で「**Hands on**」を行い、臨床での「**Tips**」を余すことなくお伝えさせていただきます。再生療法はやればできる👊

Day 1: 知識の習得とマネジメント法を学ぶ  
Day 2: 手技を習得する **10月19日(木)@北九州(仮)**



**Day.1**

**8月22日 (火) 開催!**

**ご視聴 無料!!**

## 日時

2023年8月22日 (火)  
**19:30～21:00**

## 配信方法

ZOOM ウェビナーによるWEB配信  
(事前登録制：裏面参照)

## 演者①

**芳賀 剛 先生**

学研都市歯科・矯正歯科 院長



## 演者②

**樋口 琢善 先生**

ひぐちファミリー歯科 院長



演者の詳しい略歴は事前登録画面でご確認いただけます。

ご不明な点がございましたら下記電話番号、メールアドレスへお問い合わせください。

科研製薬株式会社 九州オフィス 担当 磯橋忠亮

✉ : [isohashi\\_tadasuke@kaken.co.jp](mailto:isohashi_tadasuke@kaken.co.jp) ☎ : 080-5983-1293

事前登録用URL : <https://x.gd/BriBd>



**やればできる！リグロスを用いた歯周組織再生療法**

このウェビナーはZoomアカウントを所有するユーザーを対象にしています。Zoomは初めてですか？**無料でサインアップできます。**

日時 2023年8月22日 07:30 PM、大阪、札幌、東京

説明 日時：2023年8月22日（火）  
19：30～21：00  
費やす時間と労力が大きいとされる歯周外科が医院経営にどのように活かされるのか。  
患者さんと医院にとってメリットを生み出すための「医院マネジメント方法」と結果を出す為の「知識と手術手技」についてお伝えします。

ウェビナー登録

名\*  姓\*

メールアドレス\*

ご所属の病院・クリニック名\*

ご所属の病院・クリニックの都道府県\*

ご所属の病院・クリニックの電話番号\*

資格\*

リグロスのご使用経験はございますか。\*

ある  
 ない

登録時に提供する情報は、アカウントオーナーおよびホストと共有されます。アカウントオーナーとホストは、その情報を規約とプライバシーポリシーに従って使用・共有できます。

上記に記載のセミナーのURLまたは二次元コードより参加登録ページにアクセスしてください。

必要事項を入力いただき、登録ボタンを押してください。登録後、当日参加用のURLがメールにて送付されます。

ご登録いただくメールアドレスは、携帯電話のメールアドレス（docomo.ne.jp、softbank.ne.jp、ezweb.ne.jpなど）の場合、当日参加用のメールを受信できないことがありますので、PC用のメールアドレスをご登録ください。

7日前、前日、当日1時間前にリマインドメールが届きます。

Webセミナー当日は、メールの「ウェビナーに参加」または参加用リンクをクリックして参加をお願いします。

なお、弊社ではご入力/ご記入頂いた個人情報は、「科研製薬の個人情報保護に関する取組み <https://www.kaken.co.jp/privacy/> に従い、取り扱います。内容をご確認いただき、同意の上申込みにお進みください。

## Drug Information

●詳細は電子化された添付文書をご参照ください。「禁忌を含む使用上の注意」の改訂に十分ご注意ください。

### 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 口腔内に悪性腫瘍のある患者又はその既往歴のある患者  
[本剤が細胞増殖促進作用を有するため]

【効能・効果】 歯周炎による歯槽骨の欠損

#### 〈効能・効果に関連する使用上の注意〉

1. 本剤は、歯周ポケットの深さが4mm以上、骨欠損の深さが3mm以上の垂直性骨欠損がある場合に使用すること。
2. 本剤は、インプラント治療に関する有効性及び安全性は確立していない。

【用法・用量】 歯肉剥離掻爬手術時に歯槽骨欠損部を満たす量を塗布する。

#### 〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

本剤の使用にあたっては【臨床成績】の項を参照し適切な量を用いること。

【承認条件】 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

### 【使用上の注意】<抜粋>

#### 1. 重要な基本的注意

- (1)本剤は歯周外科手術の経験のある歯科医師又は医師が使用すること。
- (2)術後に歯肉弁の著しい陥凹を生じると予想される骨欠損部位に対しては、他の適切な治療法を考慮すること。

#### 2. 副作用

本剤が投与された安全性評価対象症例429例中3例(0.7%)に副作用が認められた。その内訳は、適用部位における歯肉白色化、歯肉紅斑、歯肉腫脹および頭痛が各1例(0.2%)であった。臨床検査値異常は429例中51例(11.9%)に認められ、その主なものは尿中アルブミン陽性27例(6.3%)、尿中β<sub>2</sub>ミクログロブリン上昇17例(4.0%)、尿中NAG上昇16例(3.7%)、CRP上昇6例(1.4%)等であった。

分類	頻度	1%以上	1%未満	頻度不明
適用部位および適用部位近傍			歯肉白色化、歯肉紅斑、歯肉腫脹	硬結、肥厚
精神神経系			頭痛	
臨床検査		尿中アルブミン陽性、尿中β <sub>2</sub> ミクログロブリン上昇、尿中NAG上昇、CRP上昇	AST(GOT)上昇、ビリルビン上昇、CK(CPK)上昇、ALT(GPT)上昇、LDH上昇、尿糖陽性、リンパ球増多、好中球減少、単球増多、白血球減少、総蛋白上昇	

●その他の使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

2022年7月改訂(第6版)



歯周組織再生剤

**リグロス<sup>®</sup> 歯科用液キット 600μg/1200μg**  
REGROTH Dental Kit 600μg/1200μg トラフェルミン (遺伝子組換え) 製剤

処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

薬価基準収載

製造販売元  
【文献請求先及び  
問い合わせ先】



**科研製薬株式会社**  
東京都文京区本駒込二丁目28番8号  
医薬品情報サービス室